

FRAP PASTA

FAST

RAT

RATICIDA



AÇÃO RÁPIDA
EXCELENTE PALATIBILIDADE

USO NÃO PROFISIONAL
DIFETIALONA: 0,025 g/kg



120G

RATOS/RATOS DOMÉSTICOS



FAST RAT

RATICIDA

FAST RAT PASTA / FRAP® PASTA

Uso não profissional

Rodenticida em pasta extremamente palatável, mesmo em relação a outros alimentos.

Isco altamente eficaz: uma ingestão é suficiente para matar os ratos.

Utilize para controlo de ratos, ratazanas e ratos domésticos, incluindo os resistentes a outros anticoagulantes.

Para uso exclusivo em interiores e em redor edifícios urbanos e rurais.

Doses de utilização:

Organismos alvo	Campos de Utilização	Dose	Distância entre os pontos de isco
Ratazana	Interior	Até 200 g	Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 4-5 metros.
	Exterior em redor de edifícios		
Rato doméstico	Interior	Até 50 g	Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 1-1.5 metros.

Instruções de utilização:

Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.

Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.

Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.

Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.

Não abrir as saquetas que contém o isco.

Antes da utilização de produtos rodenticidas, deve ser tida em conta a utilização de métodos de controlo não químicos (por exemplo, ratoeiras).

O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas.

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: "não mover ou abrir"; "contém um rodenticida"; "s.a. Difetialona" e "em caso de incidente, contactar um centro de informação antivenenos 808 250 143".

As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde foi observada atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).

Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais não visados.

Colocar as estações de isco longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.

Não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contacto com água. Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco.

As estações de isco devem ser visitadas 2 a 3 dias (no caso de ratos) e 5 a 7 dias (no caso de ratazanas) após o início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar os corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

Medidas de redução do risco:

Eliminar os roedores mortos em conformidade com as normas em vigor.

Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenção de infestação ou para detetar atividade de roedores).

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, se ainda for observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.

Procurar e remover roedores mortos durante o tratamento, pelo menos, com a mesma frequência das inspeções às estações de isco.

Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

Instruções de primeiros socorros:

Este produto contém uma substância anticoagulante.

Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas.

Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.

Em caso de:

- Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
- Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.
- Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água.

Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Não provocar o vômito.

Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.

Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem:

No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com as normas em vigor.

Condições de armazenamento:

Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e ao abrigo da luz solar direta.

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

Informação Legal

Nome comercial do produto: FRAP® PASTA

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-rnl-2/2018

Titular da autorização: LIPHATECH S.A.S. BONNEL CS10005, 47 480 PONT DU CASSE, FRANÇA

Composição do produto: 0.0025% (25 mg/kg) Difetialona (CAS n.º 104653-34-1)

Este produto contém Bitrex® (agente amargante) e corante.

Tipo de formulação: RB - Isco (pronto a usar)

Tipo de produto: TP14 rodenticidas

Categoria de utilizador: Público em geral (não profissional)

Organismos alvo: Rato doméstico (*Mus musculus*), rato castanho (*Rattus norvegicus*), rato preto ou do telhado (*Rattus rattus*)

Campos de utilização: Interior: ratos / ratazanas - Exterior em redor de edifícios: ratazanas

ATENÇÃO

H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico.

P501 - Eliminar o conteúdo/ recipiente em acordo com a legislação e regulamentos aplicáveis.

Perigoso para cães e gatos.

Perigoso para a vida selvagem.

Distribuidor: NOVAGRIL - Liscampo, S.A. - www.novagril.com

Telf. 21 347 12 71



Data de fabrico / número de lote: ver na embalagem • Peso líquido: 120 g

Data de validade: 4 anos sobre a data de fabrico

Bitrex® é uma marca registada de Macfarlan Smith. FRAP® é uma marca registada LIPHATECH



Distribuído por:
Novagril - Liscampo, SA
Tel.: +351 213 471 271
www.novagril.com



5 605313 007354